

Tabelle 2: Verbreitung ausgewählter Krankheiten und Beschwerden bei erwerbstätigen und langzeitarbeitslosen Männern und Frauen im Alter von 20 bis 59 Jahren

	Männer				Frauen			
	Erwerbstätige %	Langzeitarbeitslose			Erwerbstätige %	Langzeitarbeitslose		
		%	OR	95%-KI		%	OR	95%-KI
Chronische Bronchitis	5,6	17,0	3,41	1,83-6,35	8,0	12,2	1,66	0,84-3,28
Asthma Bronchiale	4,8	9,0	1,98	0,87-4,53	5,8	4,9	1,03	0,38-2,77
Arthrose	11,3	21,3	2,14	1,22-3,76	12,1	23,5	1,46	0,80-2,65
Chronischer Rückenschmerz	21,0	33,7	1,90	1,17-3,07	26,5	40,2	1,71	1,06-2,74
Schwindel	18,2	35,2	2,47	1,52-3,99	33,3	42,7	1,46	0,91-2,33
Hypertonie	20,3	37,5	1,89	1,15-3,10	16,6	34,9	2,16	1,31-3,58
Hypercholesterolämie	27,0	28,7	1,10	0,66-1,85	18,4	32,5	1,68	1,01-2,80
Herzrhythmusstörungen	27,0	8,0	1,22	0,53-2,85	9,2	19,8	2,14	1,18-3,87
Depression	10,5	25,3	3,36	2,00-5,64	17,8	38,8	2,74	1,69-4,44

OR: Odds Ratios für Langzeitarbeitslose im Vergleich zu Erwerbstätigen (nach Adjustierung für Alter; die Odds Ratios geben an, in welchem Verhältnis die Beschwerdebaufigkeiten bei Langzeitarbeitslosen zu der Beschwerdebaufigkeit bei Erwerbstätigen steht; Erwerbstätige = 1,00); 95%-KI: Konfidenzintervalle zu den Odds Ratios (die Odds Ratios wurden anhand einer Stichprobe geschätzt; die Konfidenzintervalle geben an, in welchem Bereich der „wahre“ Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit – hier 95 Prozent – liegt); Langzeitarbeitslosigkeit bezieht sich auf eine Arbeitslosigkeitsdauer von mindestens 12 Monaten.

Quelle: Bundesweiter Gesundheitssurvey 2003 (Robert Koch Institut); entnommen aus BT-Drucksache 15/5015: 302